

## Arboretum - Heempark Delft

### Bomen & struiken

#### Nederlandse namen en tekst

(Duivelswandelstok) - *Aralia elata* - juli - september - Oosten van Azië - Ingevoerd in 1859, Rusland

(Egelantier) - *Rosa (rubiginosa)* - juni - juli - Europa - In cultuur sinds 1594, Nederland - Rosaceae

(Glansmispel) - *Photinia villosa* - mei - juni - Oosten van Azië - Ingevoerd in 1862, Nederland - Rosaceae

(IJzerhout) - *Parrotia persica* - (bezemvorm) - maart - Iran - Ingevoerd in 1840, Engeland - Hamamelidaceae

(IJzerhout) - *Parrotia persica* - maart - Iran - Ingevoerd in 1840, Engeland - Hamamelidaceae

(Klimhortensia) - *Hydrangea anomala* subsp. *petiolaris* - juni - juli - Oosten van Azië - Ingevoerd in 1878, Engeland - Hydrangeaceae

(Pluimhortensia) - *Hydrangea paniculata* - juli - september - China, Japan - Ingevoerd in 1856, Nederland - Hydrangeaceae

#### A

Akebia *quinata* - mei - juni - Oosten van Azië - Ingevoerd in 1845, Engeland - Lardizabalaceae

Alpenbes - *Ribes alpinum* - juni - Europa - Lang in cultuur - Grossulariaceae

Althaeastruik - *Hibiscus syriacus* - juli - september - China, India (niet in het wild) - In cultuur sinds 1596, Engeland - Malvaceae

Amberboom - *Liquidambar styraciflua* - april - mei - Oosten en midden van de VS, Mexico - Ingevoerd in 1640, Nederland - Altingiaceae

Amerikaanse eik - *Quercus rubra* - mei - Midden en oosten van Noord-Amerika - Ingevoerd in 1724, Engeland - Fagaceae

Amerikaanse linde - *Tilia americana* - juli - Midden-Amerika, Noord-Amerika - In cultuur sinds 1752, Engeland - Malvaceae

Amerikaanse populier - *Populus deltoides* - maart - april - Midden van Noord-Amerika - Ingevoerd rond 1750, Frankrijk - Salicaceae

Amerikaanse toverhazelaar - *Hamamelis virginiana* - september - oktober - Midden en oosten van de VS - Ingevoerd in 1737, Engeland - Hamamelidaceae

Appel - *Malus (domestica)* - mei - Europa, westen van Azië - Lang in cultuur - Rosaceae

Appel - *Malus (toringo)* - mei - Japan - Ingevoerd in 1845, Nederland - Rosaceae

Appel - *Malus floribunda* - mei - Japan - Ingevoerd in 1856, Nederland - Rosaceae

Appel - *Malus toringo* 'Rosea' - mei - Cultivar, ingevoerd in 1845, Nederland - (De soort: Japan) - Rosaceae

*Aucuba japonica* 'Variegata' - maart - april - Cultivar, ingevoerd in 1783, Engeland - (De soort: Japan, ingevoerd in 1856, Nederland) - Garryaceae

#### B

Bamboe - *Pseudosasa japonica* - Japan - Ingevoerd in 1850, Europa - Poaceae

Bergroos - *Rosa glauca* - juni - juli - Midden en zuiden van Europa - In cultuur sinds 1818, Nederland - Rosaceae

Berijpte wilg - *Salix daphnoides* - maart - april - Europa, Azië - In cultuur sinds 1796, Duitsland - Salicaceae

Bes - *Ribes americanum* - april - mei - Midden en oosten van Noord-Amerika - Ingevoerd in 1729, Engeland - Grossulariaceae

Bes - *Ribes sanguineum* - april - mei - Noordwesten van de VS - Ingevoerd in 1836, Engeland - Grossulariaceae

Beverboom - *Magnolia kobus* - april - mei - Japan - Ingevoerd in 1865, VS - Magnoliaceae

Beverboom (Stermagnolia) - *Magnolia stellata* - maart - april - Japan - Ingevoerd 1862, VS - Magnoliaceae

Bittere wilg - *Salix purpurea* - maart - april - Europa, noorden van Azië, Middellandse Zee - Lang in cultuur - Salicaceae

Blaasspiraea - *Physocarpus opulifolius* - juni - juli - Noordoosten van Noord-Amerika - In cultuur rond 1690, Nederland - Rosaceae

Blazenstruik - *Colutea x media* - (*C. arborescens* x *C. orientalis*) - mei - september - In cultuur sinds 1623, Frankrijk - Fabaceae

Bloemwilg - *Itea virginica* - mei - juni - Oosten van de VS - In cultuur sinds 1744, Engeland - Iteaceae

Boerenjasmijn - *Philadelphus (pubescens)* - juni - juli - Zuidoosten van de VS - In cultuur sinds 1800, Engeland - Hydrangeaceae

Boerenjasmijn - *Philadelphus ('Virginal')* - (*Virginalis*groep) - juni - Ontstaan voor 1909 - Hydrangeaceae

Boerenjasmijn - *Philadelphus coronarius* - mei - juni - Europa, Kaukasus - In cultuur 1573, Oostenrijk - Hydrangeaceae

Boomhazelaar - *Corylus colurna* - februari - maart - Balkan - Ingevoerd in 1586, Oostenrijk - Betulaceae

Boskamperfoelie - *Lonicera periclymenum* - juni - augustus - Europa, Middellandse Zee - Lang in cultuur - Caprifoliaceae

Bosrank - *Clematis vitalba* - juli - September - Europa, Middellandse Zee - In cultuur sinds de 16<sup>e</sup> eeuw - Ranunculaceae

Braam - *Rubus odoratus* - juli - augustus - Midden en oosten van Noord-Amerika - In cultuur sinds 1635, Frankrijk - Rosaceae

Bruidsbloem - *Deutzia gracilis* - mei - Japan - Ingevoerd in 1829, Nederland - Hydrangeaceae

Bruidsbloem - *Deutzia scabra* - juni - juli - China, Japan - Ingevoerd in 1833, Engeland - Hydrangeaceae

Bruidsbloem - *Deutzia x rosea* - (*D. gracilis* x *D. purpurascens*) - +- 1895, Frankrijk - Hydrangeaceae

Bruine beuk - *Fagus sylvatica 'Atropunicea'* - mei - Cultivar, eind 19e eeuw - (De soort: Europa) - Fagaceae

C
---

Californische cypres - *Chamaecyparis lawsoniana* - maart - april - Noordwesten van de VS - Ingevoerd in 1854, Engeland - Cupressaceae

Californische cypres - *Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwoodii'* - maart - april - Cultivar, ontstaan rond 1920, Engeland - (De soort: noordwesten van de VS) - Cupressaceae

Californische cypres - *Chamaecyparis lawsoniana* 'Stewartii' - maart - april - Ontstaan rond 1900, Engeland - (De soort: Noordwesten van de VS) - Cupressaceae

Canadese populier - *Populus x canadensis* - (*P. deltoides* x *P. nigra*) - april - Cultivar, ontstaan rond 1750, Frankrijk - Salicaceae

Canadese populier - *Populus x canadensis* ('Serotina') - (*P. deltoides* x *P. nigra*) - april - mei - Cultivar, ontstaan +- 1750, Frankrijk - Salicaceae

Ceanothus x delilianus 'Gloire de Versailles' - (*C. caeruleus* x *C. americanus*) - juni - oktober - In cultuur voor 1830 - Rhamnaceae

Ceder - *Cedrus atlantica* - september - oktober - Atlasgebergte - Ingevoerd in 1839, Frankrijk - Pinaceae

Colorado zilverspar - *Abies concolor* - mei - Westen van de VS - Ingevoerd in 1851, Engeland - Pinaceae

Corsicaanse den - *Pinus nigra* subsp. *laricio* var. *maritima* - mei - juni - Corsica, zuiden van Italië - Ingevoerd in 1788, Engeland - Pinaceae

Chinees klokje - *Forsythia x intermedia* - (*F. suspensa* x *F. viridissima*) - april - Ontstaan in 1889, Duitsland - Oleaceae

Chinees jeneverbes - *Juniperus chinensis* 'Blaauw' - voorjaar - Cultivar, ingevoerd +- 1924, Nederland - (De soort: China) - Cupressaceae

Chinees moerascipres - *Metasequoia glyptostroboides* - voorjaar - Zuiden en westen van China - In cultuur sinds 1947, Engeland en VS - Cupressaceae

## D

Douglasspar - *Pseudotsuga menziesii* - mei - Westen van Noord-Amerika - Ingevoerd in 1827, Engeland - Pinaceae

Drents krentenboompje - *Amelanchier lamarckii* - april - mei - Oosten van Noord-Amerika - Ingevoerd in 1781, Duitsland - Rosaceae

Duinroos - *Rosa pimpinellifolia* - mei - juni - Europa, Azië - Lang in cultuur - Rosaceae

Dwergkwee - *Chaenomeles japonica* - maart-april - Japan - Ingevoerd in 1869, Engeland - Rosaceae

Dwergkwee - *Chaenomeles speciosa* - maart - april - China - Ingevoerd in 1778, Nederland - Rosaceae

Dwergmispel - *Cotoneaster* - serie *Conspicui* - mei - juni - China, Tibet, Nepal, Bhutan - Rosaceae

Dwergmispel - *Cotoneaster* - serie *Dielsiani* - mei - juli - China - Rosaceae

Dwergmispel - *Cotoneaster* - serie *Franchetoides* - juni - juli (- augustus) - China, Tibet - Rosaceae

Dwergmispel - *Cotoneaster* - serie *Horizontales* - mei - juni - Westen van China - Ingevoerd in 1877, Frankrijk - Rosaceae

Dwergmispel - *Cotoneaster* - serie *Radicantes* - mei - juni - China - Roseae

Dwergmispel - *Cotoneaster* (*apiculatus*) - mei - juni - Westen van China - Ingevoerd in 1910, VS - Rosaceae

Dwergmispel - *Cotoneaster* (*franchetti*) - juni - juli - Westen van China - Ingevoerd in 1889, Frankrijk - Rosaceae

Dwergmispel - *Cotoneaster dammeri* - mei - Midden van China - Ingevoerd in 1900, Engeland - Rosaceae

Dwergmispel - *Cotoneaster salicifolius* 'Willeke' - juni - Cultivar, introductie 20e eeuw, Nederland - (De soort: westen van China, Tibet) - Rosaceae

## E

Eenstijlige meidoorn - *Crataegus monogyna* - mei - Europa, Middellandse Zee - Lang in cultuur - Rosaceae

Eik - *Quercus castaneifolia* - mei - Oosten van de Middellandse Zee, Voor-Azië, Kaukasus - Ingevoerd rond 1858, Nederland - Fagaceae

Eleutherococcus sieboldianus - juni - juli - Japan - Ingevoerd in 1856, Nederland - Araliaceae

Engelse veldiep - *Ulmus procera* - februari - maart - Engeland, Middellandse Zee - Lang in cultuur - Ulmaceae

Erwtenstruik - *Caragana arborescens* - mei - Siberië, Mantsjoerije - In cultuur sinds 1748, Zweden - Fabaceae

Escallonia ('Donard Seedling') - (*Escallonia rubra* (var. *macrantha*) x *Escallonia virgata*) - juni - juli - Introductie na 1904, Noord-Ierland - Escalloniaceae

Esdoorn - *Acer cissifolium* - mei - Japan - Ingevoerd in 1860, Nederland - Sapindaceae

Esdoorn - *Acer tataricum* - voorjaar - Zuidoosten van Europa, westen van Azië - In cultuur sinds 1759 - Sapindaceae

Europese netelboom - *Celtis australis* - april - mei - Middellandse Zee - In cultuur sinds 1596, Engeland - Cannabaceae

## F

Fijnspar / Kerstspaar - *Picea abies* - mei - Europa - Lang in cultuur - Pinaceae

Fluweelboom - *Rhus typhina* - juni - juli - Midden en oosten van Noord-Amerika - In cultuur sinds 1622, Frankrijk - Anacardiaceae

Framboos - *Rubus idaeus* - mei - augustus - Noordelijk halfrond - Sinds lang in cultuur - Rosaceae

## G

Ganzerik - *Potentilla fruticosa* - mei - september - Europa, Noord-Azië, China - Lang in cultuur - Rosaceae

Gelderse roos - *Viburnum opulus* - mei - juni - Europa, Middellandse Zee, noorden van Azië - Lang in cultuur - Adoxaceae

Gele alpenbes - *Ribes aureum* - april - mei - Westen en midden van Noord-Amerika - Ingevoerd in 1812, Engeland - Grossulariaceae

Gele kornoelje - *Cornus mas* - februari - maart - Europa, westen van Azië - Lang in cultuur - Cornaceae

Geoorde wilg - *Salix aurita* - maart - april - Europa, westen van Azië - Lang in cultuur - Salicaceae

Gewone acacia - *Robinia pseudoacacia* - juni - Midden en oosten van de VS - Ingevoerd in 1601, Frankrijk - Fabaceae

Gewone beuk - *Fagus sylvatica* - mei - Europa - Lang in cultuur - Fagaceae

Gewone es - *Fraxinus excelsior* - mei - Europa - Lang in cultuur - Fagaceae

Gewone es - *Fraxinus excelsior* 'Westhof's Glorie' - april - Vondst, 1947, Nederland - (De soort: Europa, westen van Azië) - Oleaceae

Gewone esdoorn - *Acer pseudoplatanus* - mei - Europa, westen van Azië - Lang in cultuur - Sapindaceae

Gewone gagel - *Myrica gale* - maart - april - Noordelijk halfrond - In cultuur sinds 1600, Nederland - Myricaceae

Gewone haagbeuk - *Carpinus betulus* - april - mei - Europa, West-Azië - Lang in cultuur - Betulaceae

Gewone haagbeuk - *Carpinus betulus* 'Fastigiata' - april - mei - In cultuur sinds 1876, Duitsland - (De soort: Europa, westen van Azië) - Betulaceae

Gewone hazelaar - *Corylus avellana* - jan - maart - Europa, Middellandse Zee - In cultuur sinds de Oudheid - Betulaceae

Gewone jeneverbes - *Juniperus communis* - april - Noordelijk halfrond - Lang in cultuur - Cupressaceae

Gewone jeneverbes - *Juniperus communis* 'Hibernica' - april - Cultivar, in cultuur sinds 1636, Engeland - (De soort: noordelijk halfrond) - Cupressaceae

Gewone kardinaalshoed - *Euonymus europaeus* - mei - Europa, westen van Azië - Lang in cultuur - Celastraceae

Gewone laurierkers - *Prunus laurocerasus* - mei - Balkan, Klein-Azië - Ingevoerd in 1558, Italië - Rosaceae

Gewone liguster - *Ligustrum vulgare* - juni - juli - Europa, Middellandse Zee - Lang in cultuur - Oleaceae

Gewone plataan - *Platanus x hispanica* - (*P. occidentalis* x *P. orientalis*) - april - mei - Ontstaan rond 1670, Engeland - Platanaceae

Gewone sering - *Syringa vulgaris* - mei - Midden en zuidoosten van Europa - In cultuur sinds 1554, Italië - Oleaceae

Gewone taxus - *Taxus baccata* - maart - april - Europa, Middellandse Zee - In cultuur sinds de Oudheid - Taxaceae

Gewone taxus - *Taxus baccata* 'Repandens' - maart - april - Cultivar, sinds 1887, Engeland - (De soort: Europa, Middellandse Zee) - Taxaceae

Gewone vleugelnoot / Kaukasische vleugelnoot - *Pterocarya fraxinifolia* - mei - Kaukasus / Oriënt - Ingevoerd in 1782, Engeland - Juglandaceae

Gewone vlier - *Sambucus nigra* - mei - juni - Europa, Middellandse Zee - Lang in cultuur - Adoxaceae

Gewone vuilboom - *Frangula alnus* - juni - augustus - Europa, Middellandse Zee - Lang in cultuur - Rhamnaceae

Goudenregen - *Laburnum alpinum* - juni - Midden en zuiden van Europa - In cultuur sinds 1596, Engeland - Fabaceae

Goudenregen - *Laburnum anagyroides* - mei - juni - Midden en zuiden van Europa - In cultuur sinds 1560, Duitsland - Fabaceae

Goudenregen - *Laburnum x watereri* - (*L. alpinum* x *L. anagyroides*) - juni - Ontstaan rond 1840, Engeland - Fabaceae

Grauwe abeel - *Populus x canescens* - (*P. alba* x *P. tremula*) - maart - april - Lang in cultuur - Salicaceae

Grauwe wilg - *Salix cinerea* - maart - april - Europa, westen van Azië - Lang in cultuur - Salicaceae

Griekse zilverspar - *Abies cephalonica* - mei - Griekenland - Ingevoerd in 1824, Engeland - Pinaceae

Grijze wilg - *Salix elaeagnos* - april - mei - Midden en zuiden van Europa, Klein-Azië - In cultuur sinds 1762, Frankrijk - Salicaceae

Grove den - *Pinus sylvestris* - mei - juni - Europa, noorden van Azië - Lang in cultuur - Pinaceae

Haagbeukbladige hopbeuk - *Ostrya carpinifolia* - april - mei - Middellandse Zee - In cultuur sinds 1724, Engeland - Betulaceae

Haagliguster - *Ligustrum ovalifolium* - juni - juli - Japan - Ingevoerd in 1843, Nederland - Oleaceae

Hartbladige els - *Alnus cordata* - maart - april - Italië, Corsica, Kaukasus - In cultuur sinds 1815, Frankrijk - Betulaceae

Hemelboom - *Ailanthus altissima* - juni - juli - China - Ingevoerd rond 1750, Frankrijk - Simaroubaceae

Herfstpaardenkastanje - *Aesculus parviflora* - juli - augustus - Zuidoosten van de VS - Ingevoerd in 1786, Engeland - Sapindaceae

Himalayaceder - *Cedrus deodara* - september - oktober - Westen van de Himalaya - Ingevoerd in 1822, Engeland - Pinaceae

Hollandse linde - *Tilia x europaea* 'Koningslinde' - (*T. cordata* x *T. platyphyllos*) - juni - Introductie 1945, Nederland - Malvaceae

Honderdbladige roos - *Rosa centifolia* - juni - juli - Kaukasus - In cultuur sinds de Oudheid - Rosaceae

Hondsroos - *Rosa canina* - juni - juli - Europa, Middellandse Zee - Lang in cultuur - Rosaceae

Hongaarse sering - *Syringa josikaea* - mei - juni - Karpaten - Ingevoerd in 1830, Oostenrijk - Oleaceae

Honingboom - *Styphnolobium japonicum* - augustus - september - China, Korea - Ingevoerd rond 1750, Frankrijk - Fabaceae

## I

Iep - *Ulmus* 'Columella' - ((*U. glabra* 'Exoniensis' x *U. wallichiana*) x (*U. minor* nr. 1 x *U. minor* nr. 28)) - maart - april - Introductie 1989, Nederland - Ulmaceae

Iep - *Ulmus x hollandica* - (*U. carpinifolia* x *U. glabra*) - maart - april - Lang in cultuur - Ulmaceae

Iep - *Ulmus x hollandica* 'Commelin' - (*U. carpinifolia* x *U. glabra*) - maart - april - Cultivar, ontstaan +- 1950, Nederland - Ulmaceae

Iep (Fladderiep, Steeliep) - *Ulmus laevis* - februari - maart - Midden van Europa, westen van Azië - In cultuur sinds 1800, Duitsland - Ulmaceae

Indigostruik - *Indigofera heterantha* - juli - september - Himalaya - In cultuur sinds 1840, Engeland - Fabaceae

## J

Japanse bottelroos / Rimpelroos - *Rosa rugosa* - mei - augustus - Oosten van Azië - Ingevoerd rond 1796, Engeland - Rosaceae

Japanse cypres - *Chamaecyparis pisifera* 'Filifera' - maart - april - Cultivar in 1861 ingevoerd, Engeland - (De soort: Japan) - Cupressaceae

Japanse esdoorn - *Acer palmatum* - mei - Japan, Korea - Ingevoerd in 1832, Engeland - Sapindaceae

Japanse hulst - *Ilex crenata* - mei - juni - Japan - Ingevoerd in 1860, Nederland - Aquifoliaceae

Japanse notenboom - *Ginkgo biloba* - april - mei - China - Ingevoerd rond 1770, Nederland - Ginkgoaceae

Japanse sierkers - *Prunus serrulata* - cultivar - april - mei - Japan - Ingevoerd in 1819, Engeland - Rosaceae

Japanse toverhazelaar - *Hamamelis japonica* - januari - maart - Japan - Ingevoerd in 1859, Nederland - Hamamelidaceae

Japanse wijnbes - *Rubus phoenicolasius* - juni - juli - Oosten van Azië - Ingevoerd 1876, Frankrijk - Rosaceae

Jeneverbes - *Juniperus virginiana* ('Grey Owl') - voorjaar - Cultivar, ontstaan in 1938, Nederland - (de soort: oosten van Noord-Amerika) - Cupressaceae

Jeneverbes - *Juniperus x media* 'Pfitzeriana' - (*J. sabina* x *J. chinensis*) - voorjaar - Cultivar, 1e vermelding 1899, Duitsland - Cupressaceae

Judasboom - *Cercis siliquastrum* - april - mei - Middellandse Zee - In cultuur sinds de Oudheid - Fabaceae

K
---

Kaimastruik - *Rhodotypos scandens* - mei - juli - China, Japan - Ingevoerd in 1860, Nederland - Rosaceae

Kamperfoelie - *Lonicera ledebourii* - juni - juli - Californië - Ingevoerd in 1838, Engeland - Caprifoliaceae

Kamperfoelie - *Lonicera maackii* - mei - juni - Mantsjoerije, Korea - Ingevoerd rond 1860, Rusland - Caprifoliaceae

Kamperfoelie - *Lonicera morrowii* - mei - juni - Japan - Ingevoerd rond 1875 - Caprifoliaceae

Kamperfoelie - *Lonicera tatarica* - mei - juni - Zuiden van Rusland, Altaigebergte - In cultuur sinds 1752, Engeland - Caprifoliaceae

Kamperfoelie - *Lonicera xylosteum* - mei - juni - Europa, Middellandse Zee, Midden van Azië - Lang in cultuur - Caprifoliaceae

Kardinaalshoed - *Euonymus alatus* - mei - juni - Oosten van Azië - Ingevoerd 1856, Nederland - Celastraceae

Katsoeraboom (Hartjesboom) - *Cercidiphyllum japonicum* - mei - Oosten van Azië - Ingevoerd in 1865, VS - Cercidiphyllaceae

Katwilg - *Salix viminalis* - maart - april - Europa, noorden van Azië - Lang in cultuur - Salicaceae

Kerspruim - *Prunus cerasifera* - april - Balkan, westen van Azië - In cultuur sinds 1594, Nederland - Rosaceae

Kerspruim - *Prunus cerasifera* 'Nigra' - april - Cultivar, sinds 1916, VS - (De soort: Balkan, westen van Azië) - Rosaceae

Kogelbloem - *Cephalanthus occidentalis* - juli - augustus - Noord-Amerika - Ingevoerd in 1735, Engeland - Rubiaceae

Kolkwitzia amabilis - mei - juni - China - Ingevoerd in 1901, Engeland - Linnaeaceae

Kornoelje - *Cornus kousa* (cultivar) - mei - juni - Japan, Korea - Ingevoerd in 1860, Nederland - Cornaceae

Kornoelje - *Cornus stolonifera* 'Flaviramea' - mei - juli - Cultivar, sinds 1899, Duitsland - (De soort: midden en oosten van Noord-Amerika) - Cornaceae

Kraakwilg - *Salix fragilis* - april - mei - Europa, West-Azië - Lang in cultuur - Salicaceae

Krimlinde - *Tilia x europaea* 'Euchlora' - (*T. cordata* x *T. platyphyllos*) - juni - Cultivar, in cultuur voor 1950, Duitsland - Malvaceae

Kruisbes - *Ribes uva-crispa* - april - mei - Europa, Middellandse Zee - In cultuur sinds +- 1500 - Grossulariaceae

Kruisbes - *Ribes uva-crispa* - april - mei - Europa, Middellandse Zee - In cultuur rond 1500 - Grossulariaceae

Kweepeer - *Cydonia oblonga* - mei - Midden van Azië - Lang in cultuur - Rosaceae

L
---

Lambertsnoot - *Corylus maxima* 'Purpurea' - januari - maart - cultivar, sinds 1759, Engeland - (De soort: zuidoosten van Europa, westen van Azië) - Betulaceae

Lampionboom - *Koelreuteria paniculata* - juli - augustus - Oosten van Azië - Ingevoerd rond 1750, Frankrijk - Sapindaceae

Liguster - *Ligustrum obtusifolium* - juni - juli - Japan - Ingevoerd in 1856, Nederland - Oleaceae

Liguster - *Ligustrum obtusifolium* var. *regelianum* - juni - juli - China - Ingevoerd in 1885, Frankrijk - Oleaceae

Liguster - *Ligustrum quihoui* - juli - september - China - Ingevoerd in 1908, Frankrijk - Oleaceae

Lijsterbes - *Sorbus americana* - mei - Midden en oosten van Noord-Amerika - In cultuur sinds 1809, Duitsland - Rosaceae

Lijsterbes - *Sorbus intermedia* - mei - Zuiden van Scandinavië, zuiden van de Oostzeekust - Lang in cultuur - Rosaceae

Lijsterbesspiraea - *Sorbaria (sorbifolia)* - juni - augustus - Azië - In cultuur sinds 1759, Engeland - Rosaceae

## M

Mahonia x *wagneri* 'Pinnacle' - (*M. x aquifolium* x *M. pinnata*) - maart - april - In cultuur sinds 1930, Nederland - Berberidaceae

Mammoetboom / Reuzensequoia - *Sequoiadendron giganteum* - mei - Californië - Ingevoerd in 1853, Engeland - Cupressaceae

Meidoorn - *Crataegus x grignonensis* - (*C. crus-galli* x *C. pubescens*) - mei - juni - In cultuur sinds 1873, Frankrijk - Rosaceae

Meidoorn - *Crataegus x prunifolia* - (*C. crus-galli* x *C. macracantha*) - mei - In cultuur sinds 1783, Duitsland - Rosaceae

Mispel - *Mespilus germanica* - mei - Westen van Azië - Lang in cultuur - Rosaceae

Moerascipres - *Taxodium distichum* - mei - Zuiden en zuidoosten van de VS - In cultuur sinds 1640, Engeland - Cupressaceae

Moeraseik - *Quercus palustris* - mei - Noordoosten van de VS - In cultuur sinds 1770, Duitsland - Fagaceae

Moseik / Turkse eik - *Quercus cerris* - mei - Oosten van de Middellandse Zee - In cultuur sinds 1735, Engeland - Fagaceae

## N

Noorse esdoorn - *Acer platanoides* - april - mei - Europa, Kaukasus - Lang in cultuur - Sapindaceae

Nordmannspar - *Abies nordmanniana* - mei - Kaukasus, Klein-Azië - Ingevoerd in 1840, Engeland - Pinaceae

## O

Okkernoot / Walnoot - *Juglans regia* - april - mei - Zuidoosten van Europa, midden van Azië - Lang in cultuur - Juglandaceae

Olijfwilg - *Elaeagnus x ebbingei* - (*E. macrophylla* x *E. pungens*) - oktober - november - Japan - Kruising ontstaan in 1927, Nederland, Den Haag - Elaeagnaceae

Oostenrijkse den - *Pinus nigra* subsp. *nigra* - mei - juni - Zuidoosten van Europa - Ingevoerd in 1835, Engeland - Pinaceae



Oosterse plataan - *Platanus orientalis* - april - mei - Oriënt - In cultuur 1548, Engeland - Platanaceae

P

Papierberk - *Betula papyrifera* - april - mei - Noord-Amerika - Lang in cultuur - Betulaceae

Papiermoerbeiboom (vrouw) - *Broussonetia papyrifera* - mei - China, Japan - In cultuur sinds 1884, Engeland - Moraceae

Parelstruik - *Exochorda racemosa* - mei - Oosten van China - Ingevoerd in 1849, Engeland - Rosaceae

Paulownia tomentosa - maart - mei - China - Ingevoerd in 1834, Frankrijk - Paulowniaceae

Peer - *Pyrus communis* - april - mei - Europa, westen van Azië - Lang in cultuur - Rosaceae

Peer (Wilgbladige peer) - *Pyrus salicifolia* 'Pendula' - april - mei - Cultivar, ingevoerd in 1780, Engeland - (De soort: Balkan, westen van Azië) - Rosaceae

Perzische sering - *Syringa x persica* - (*S. vulgaris* x *S. laciniata*) - juni - In cultuur sinds 1640, Engeland - Oleaceae

Pluimes - *Fraxinus ornus* - mei - juni - Zuiden van Europa, westen van Azië - Lang in cultuur - Oleaceae

Pluimiep - *Ulmus glabra* 'Exoniensis' - februari - maart - Cultivar, ontstaan rond 1826, Engeland - (De soort: Europa) - Ulmaceae

Populier - *Populus lasiocarpa* - maart - april - Midden en westen van China - Ingevoerd in 1904, Engeland - Salicaceae

Prachtframboos - *Rubus spectabilis* - maart - april - Westen van Noord-Amerika - Ingevoerd in 1827, Engeland - Rosaceae

Pruikenboom - *Cotinus coggygria* - juni - juli - Zuiden van Europa tot in China - In cultuur sinds 1594, Nederland - Anacardiaceae

*Prunus x amygdalopersica* - (*P. dulcis* x *P. persica*) - maart - april - In cultuur sinds 1623, Zwitserland - Rosaceae

R

Ranonkelstruik - *Kerria japonica* - mei - juni - Ingevoerd rond 1700 uit Japan - Rosaceae

Ratelpopulier / Esp - *Populus tremula* - maart - april - Europa, Azië, Middellandse Zee - Lang in cultuur - Salicaceae

Reuzenlebensboom - *Thuja plicata* - april - Westen van Noord-Amerika - Ingevoerd in 1853, Engeland - Cupressaceae

Rode kornoelje - *Cornus sanguinea* - mei - juli - Europa - Lang in cultuur - Cornaceae

Rode paardenkastanje - *Aesculus x carnea* - (*A. hippocastanum* x *A. pavia*) - mei - Ontstaan +- 1888, Frankrijk - Sapindaceae

Roos - *Rosa moyesii* - juni - juli - Westen van China - Ingevoerd in 1903, Engeland - Rosaceae

Roos - *Rosa nitida* - juni - juli - Oosten van Canada, noordoosten van de VS - Ingevoerd in 1807, Engeland - Rosaceae

Roos - *Rosa omeiensis* 'Pteracantha' - mei - juni - Ingevoerd in 1901, Engeland - (De soort: westen van China) - Rosaceae

Roos - *Rosa x alba* - (*R. corymbifera* x *R. gallica*) - juni - In cultuur sinds 1597 , Engeland - Rosaceae

Roos - *Rosa xanthina* f. *hugonis* - mei - juni - Oosten van Azië (cultuur) - Ingevoerd in 1899, VS - Rosaceae

Ruwe berk - *Betula pendula* - april - Europa, Klein-Azië - Lang in cultuur - Betulaceae

Ruwe berk - *Betula pendula* 'Purpurea' - april - Europa, Klein-Azië - Cultivar, ontstaan rond 1870, Frankrijk - (De soort: Europa, Klein-Azië) - Betulaceae

## S

Scherpe hulst / Groene hulst (man) - *Ilex aquifolium* - mei - juni - Europa, westen van Azië - In cultuur sinds de Oudheid - Aquifoliaceae

Schietwilg - *Salix alba* - mei - Europa, Middellandse Zee, noorden van Azië - Lang in cultuur - Salicaceae

Schijnbeuk - *Nothofagus antarctica* - voorjaar - Zuiden van Zuid-Amerika - Ingevoerd in 1840, Engeland - Nothofagaceae

Schijnhazelaar - *Corylopsis pauciflora* - maart - april - Japan - Ingevoerd in 1860, Rusland - Hamamelidaceae

Schijnhazelaar - *Corylopsis spicata* - maart - april - Japan - Ingevoerd in 1856, Nederland - Hamamelidaceae

Schoonvrucht - *Callicarpa bodinieri* var. *giraldii* 'Profusion' - juni - juli - Cultivar, een vondst +- 1958, Nederland - (De soort: China) - Lamiaceae

Sering - *Syringa reflexa* - juni - Midden van China - Ingevoerd in 1910, VS - Oleaceae

Servisische spar - *Picea omorika* - mei - Westen van de Balkan - Ingevoerd in 1880, Duitsland - Pinaceae

Siberische lariks - *Larix siberica* - voorjaar - Noordoosten van Europa, Siberië - Ingevoerd in 1806, Engeland - Pinaceae

Sierkers - *Prunus serrula* - april - Westen van China - Ingevoerd in 1908, Engeland - Rosaceae

Sierkers - *Prunus subhirtella* 'Autumnalis' - april - mei - Japan - Ingevoerd in 1894, VS - Rosaceae

Sierspar - *Picea pungens* - mei - Westen van de VS - Ingevoerd in 1863, Engeland - Pinaceae

Sleedoorn - *Prunus spinosa* - maart - april - Europa, Middellandse Zee - Lang in cultuur - Rosaceae

Sneeuwbes - *Symphoricarpos albus* var. *laevigatus* - juli - september - Oosten van Canada, noorden van de VS - Ingevoerd in 1817, Engeland - Caprifoliaceae

Spaanse aak / Veldesdoorn - *Acer campestre* - mei - Europa, westen van Azië - Lang in cultuur - Sapindaceae

Spiraea (decumbens) - juni - Zuidoosten van de Alpen - In cultuur sinds 1830, Duitsland - Rosaceae

Spiraea (x arguta) - (*S. multiflora* x *S. thunbergii*) - mei - Ontstaan +- 1884, Duitsland - Rosaceae

Spiraea nipponica - mei - juni - Japan - Ingevoerd in 1870, Nederland - Rosaceae

Spiraea trichocarpa - juni - Korea - Ingevoerd in 1920 - Rosaceae

Spiraea x billiardii - (*S. douglasii* x *S. salicifolia*) - juli - september - Ontstaan rond 1854, Frankrijk - Rosaceae

Spiraea x vanhouttei - (*S. cantoniensis* x *S. trilobata*) - mei - juni - Ontstaan rond 1862, Frankrijk - Rosaceae

Steenlinde - *Phillyrea vilmoriniana* - mei - Westen van Azië - Ingevoerd in 1866, Frankrijk - Oleaceae

Stephanandra incisa - juni - juli - Japan, Korea - Ingevoerd rond 1872, Rusland - Rosaceae

Stephanandra tanakae - juni - juli - Japan - Ingevoerd in 1893, Engeland - Rosaceae

**Symphoricarpos orbiculatus** - juli - september - Midden en oosten van de VS - In cultuur sinds 1730, Engeland - Salicaceae

<b>T</b>
----------

**Tamarisk** - *Tamarix tetrandra* - april - mei - Oosten van de Middellandse Zee - Ingevoerd in 1821 - Tamaricaceae

**Tamme kastanje** - *Castanea sativa* - juni - juli - Europa, Middellandse Zee - Lang in cultuur - Fagaceae

**Thunbergspirea** - *Spiraea thunbergii* - april - mei - China, Japan - Ingevoerd in 1859, Nederland - Rosaceae

**Toverhazelaar** - *Hamamelis mollis* - december - maart - Midden van China - Ingevoerd in 1879, Engeland - Hamamelidaceae

**Treurwilg** - *Salix x sepulcralis 'Chrysocoma'* - (*Salix alba* x *Salix babylonica*) - april - mei - Cultivar, ontstaan rond 1815, Frankrijk - Salicaceae

**Trompetboom** - *Catalpa ovata* - juli - augustus - China - Ingevoerd in 1849, Nederland - Bignoniaceae

**Tulpenboom** - *Liriodendron tulipifera* - juni - Oosten van de VS - In cultuur rond 1663, Engeland - Magnoliaceae

<b>V</b>
----------

**Valse Christusdoorn** - *Gleditsia triacanthos* - juni - juli - Westen en midden van de VS - In cultuur 1700, Engeland - Fabaceae

**Vederesdoorn** - *Acer negundo* - maart - april - Midden en oosten van Noord-Amerika - In cultuur - sinds 1688, Engeland - Sapindaceae

**Veelbloemige roos / Trosroos** - *Rosa multiflora* - juni - augustus - Japan, Korea - Ingevoerd in 1804, Engeland - Rosaceae

**Veldiep** - *Ulmus minor* - februari - maart - Europa, Middellandse Zee - In cultuur sinds 1633, Engeland - Ulmaceae

**Viburnum carlesii** - april - mei - Korea - Ingevoerd in 1885, Japan - Adoxaceae

**Viburnum farreri** - (november -) februari - april - Noorden van China - Ingevoerd in 1911, Engeland - Adoxaceae

**Viburnum rhytidophyllum** - mei - juni - Midden en westen van China - Ingevoerd in 1900, Engeland - Adoxaceae

**Viburnum x burkwoodii** - (*V. carlesii* x *V. utile*) - april - mei - Ontstaan in 1824, Engeland - Adoxaceae

**Vlinderstruik** - *Buddleja alternifolia* - juni - Noordwesten van China - Ingevoerd in 1914, Engeland - Scrophulariaceae

**Vlinderstruik** - *Buddleja davidii* - juli - september - China - ingevoerd in 1893, Frankrijk - Scrophulariaceae

**Vlinderstruik** - *Buddleja davidii* ('Camkeep') - augustus - september - Cultivar, ontstaan in Engeland - (De soort: China, ingevoerd in 1893, Frankrijk) - Scrophulariaceae

**Vogelkers** - *Prunus padus* - mei - Europa, westen van Azië - Lang in cultuur - Rosaceae

<b>W</b>
----------

Wasgagel - *Myrica pennsylvanica* - april - mei - Oosten van Noord-Amerika - Ingevoerd rond 1725, Engeland - Myricaceae

Waterwilg - *Salix caprea* - maart - april - Europa, noorden van Azië - Lang in cultuur - Salicaceae

Wegedoorn - *Rhamnus cathartica* - mei - juni - Europa tot Noord-Azië - Lang in cultuur - Rhamnaceae

Weichselboom - *Prunus mahaleb* - april - mei - Europa, westen van Azië - Lang in cultuur - Rosaceae

Weigela florida - mei - juli - Noorden van China, Korea - Ingevoerd in 1844, Engeland - Diervillaceae

Weigela japonica ('Bristol Ruby') - mei - juni - Cultivar, ontstaan +- 1946, VS - (De soort: Japan) - Diervillaceae

Westerse levensboom - *Thuja occidentalis* - maart - april - Oosten van Noord-Amerika - Ingevoerd - waarschijnlijk in 1534, Frankrijk - Cupressaceae

Weymouthden - *Pinus strobus* - mei - juni - Midden en oosten van Noord-Amerika - In cultuur sinds 16e eeuw, Frankrijk - Pinaceae

Wilde lijsterbes - *Sorbus aucuparia* - mei - Europa, Siberië - Lang in cultuur - Rosaceae

Wilg - *Salix* (*x smithiana*) - (*S. caprea x S. viminalis*) - april - mei - In cultuur sinds 1808, Duitsland - Salicaceae

Wintereik - *Quercus petraea* - mei - Europa, westen van Azië - Lang in cultuur - Fagaceae

Wintereik - *Quercus petraea* 'Mespilifolia' - mei - Cultivar, ontstaan rond 1843 in Frankrijk - (De soort: Europa, westen van Azië) - Fagaceae

Winterlinde / Kleinbladige linde - *Tilia cordata* - juni - Europa - Lang in cultuur - Malvaceae

Witte els / Grauwe els - *Alnus incana* - januari - maart - Europa, West-Azië, Noord-Amerika - In cultuur sinds 1780, Engeland - Betulaceae

Witte esdoorn - *Acer saccharinum* - maart - april - Midden en oosten van Noord-Amerika - Ingevoerd in 1725, Engeland - Sapindaceae

Witte kornoelje - *Cornus alba* - mei - juni - Oosten van Europa, noorden van Azië - In cultuur sinds 1741, Engeland - Cornaceae

Witte moerbeï - *Morus alba* - mei - China - In cultuur sinds de Oudheid - Moraceae

Witte paardenkastanje - *Aesculus hippocastanum* - mei - Balkan - Ingevoerd in 1557 - Sapindaceae

Wollige sneeuwbal - *Viburnum lantana* - mei - juni - Europa, Middellandse Zee - In cultuur sinds 1594, Nederland - Adoxaceae

## X

x *Cuprocyparis leylandii* - (*Xanthocyparis nootkatensis x Cupressus macrocarpa*) - maart - april - Ontstaan rond 1888, Engeland - Cupressaceae

x *Mahoberberis neubertii* - (*Mahonia aquifolium x Berberis vulgaris*) - voorjaar - Ontstaan rond 1850, Frankrijk - Berberidaceae

*Xanthocyparis nootkatensis* 'Pendula' - maart - april - Westen van Canada, noordwesten van de VS - Ingevoerd rond 1850, Rusland - Cupressaceae

## Z

Zachte berk - *Betula pubescens* - april - mei - Europa, noorden van Azië - Lang in cultuur - Betulaceae

Zeeden - *Pinus pinaster* - juni - Westen van de Middellandse Zee - Lang in cultuur - Pinaceae

Zevenboom - *Juniperus sabina* - voorjaar - Midden van Europa, Middellandse Zee, Siberië - In Cultuur sinds de Oudheid - Cupressaceae

Zilverlinde - *Tilia tomentosa* 'Pendula' - juli - Cultivar, sinds 1767, Engeland - (De soort: Zuidoosten van Europa, Klein-Azië) - Malvaceae

Zilverspar - *Abies koreana* - mei - Korea - Ingevoerd in 1905, Frankrijk - Pinaceae

Zoete kers / Kriek - *Prunus avium* - april - mei - Europa, westen van Azië - Lang in cultuur - Rosaceae

Zomereik - *Quercus robur* - april - mei - Europa, Middellandse Zee - Lang in cultuur - Fagaceae

Zomerlinde / Grootbladige linde - *Tilia platyphyllos* - mei - juni - Europa - Lang in cultuur - Malvaceae

Zoutstruik - *Halimodendron halodendron* - juni - juli - Westen van Azië tot Altaigebergte - Ingevoerd in 1779 - Fabaceae

Zuurbes - *Berberis (x mentorensis)* - (*B. julianae* x *B. thunbergii*) - mei - Ontstaan in 1925, VS - Berberidaceae

Zuurbes - *Berberis aggregata* - mei - juni - Westen van China - Ingevoerd in 1903, Engeland - Berberidaceae

Zuurbes - *Berberis gagnepainii* - mei - juni - Westen van China - Ingevoerd in 1904, Engeland - Berberidaceae

Zuurbes - *Berberis julianae* - mei - juni - Midden van China - Ingevoerd in 1900, Engeland - Berberidaceae

Zuurbes - *Berberis koreana* - mei - juni - Korea - Ingevoerd in 1905, Engeland - Berberidaceae

Zuurbes - *Berberis pratti* - juni - juli - Westen van China - Ingevoerd in 1904, Engeland - Berberidaceae

Zuurbes - *Berberis thunbergii* - mei - Japan - Ingevoerd in 1860, Nederland - Berberidaceae

Zuurbes - *Berberis verruculosa* - mei - juni - Westen van China - Ingevoerd in 1904, Engeland - Berberidaceae

Zuurbes - *Berberis vulgaris* - mei - Europa - In cultuur sinds 1594, Nederland - Berberidaceae

Zuurbes - *Berberis x media* - (*B. hybrido-gagnepainii* 'Chenaultii' x *B. thunbergii*) - mei - juni - Ontstaan +- 1950, Boskoop - Berberidaceae

Zuurbes - *Berberis x stenophylla* - (*B. darwinii* x *B. empetrifolia*) - mei - Ontstaan rond 1860, Engeland - Berberidaceae

Zwarte berk - *Betula nigra* - maart - april - Oosten en midden van de VS - In cultuur sinds 1736, Engeland - Betulaceae

Zwarte den - *Pinus nigra* - mei - juni - Midden en zuiden van Europa, Klein-Azië - Ingevoerd in 1759, Engeland - Pinaceae

Zwarte els - *Alnus glutinosa* - januari - maart - Europa, Kaukasus, Siberië - Lang in cultuur - Betulaceae

Zwarte walnoot / Bitternoot - *Juglans nigra* - mei - Midden en oosten van de VS - In cultuur sinds 1629, Engeland - Juglandaceae

