

P - ORCHIDEEËNVELD

Juni 2016

1 Drents krentenboompje - *Amelanchier lamarckii* - Noord-Amerika

2 Katwilg - *Salix viminalis* - Europa, Azië

3 Moerascipres - *Taxodium distichum* - VS

4 Moerascipres - *Taxodium distichum* - VS

5 Moerascipres - *Taxodium distichum* - VS

6 Moerascipres - *Taxodium distichum* - VS

7 Waterwilg - *Salix caprea* - Europa, Azië

8 Waterwilg - *Salix caprea* - Europa, Azië

9 Waterwilg - *Salix caprea* - Europa, Azië

10 Berijpte wilg - *Salix daphnoides** - Europa, Azië - in de lente zijn de twijgen en scheuten bedekt met een waslaagje. De twijgen en jonge scheuten verkleuren van rood naar purperrood en worden later groen. De blaadjes zijn aanvankelijk wit

behaard, maar sommige bladeren hebben tijdelijk een roestkleurig pelsje.



10, 11 Berijpte wilg - rijp en twijgen

11 Berijpte wilg - *Salix daphnoides** - Europa, Azië - zie 10



10, 11 Berijpte wilg

12 Schietwilg - *Salix alba* - Europa, Middellandse Zee, Azië

* 10, 11 Berijpte wilg - wordt vaak verward met de Kaspische zandwilg *Salix acutifolia*, die in het voorjaar ook berijpt is met een waslaagje. Een duidelijk onderscheid is de groeiwijze, want de takken van de Kaspische zandwilg hangen spoedig over en groeien dan horizontaal. Bovendien heeft het blad van de Berijpte wilg 8-12 zijnerfjes en van de Kaspische zandwilg minimaal 15 zijnerfjes.